

NYHET!

Nu som **SMÄLTTABLETT**

Hokus, pokus, fili...borta!



Lätt att ta
Smälter snabbt
i munnen
Ingen vätska
behövs

NYHET
Minirin[®]
DESMOPRESSIN SMÄLTTABLETT
MELT 60/120 μ g

Lägre dos. Samma effekt.

MINIRIN (desmopressin) 120 µg Frystorkad tablett

- 120 µg MINIRIN frystorkad tablett motsvarar 0,2 mg MINIRIN tablett.¹
- Smälter snabbt i munnen.
- Ingen vätska behövs.
- Bra för alla, även för den som tycker att det är svårt eller obehagligt att svälja vanliga tablett.
- MINIRIN 120 µg frystorkad tablett är spröd och kan inte tryckas genom folien utan ska tas ut genom att folien först dras av.
- Vid behandling med MINIRIN ska vätskeintaget begränsas. 1 timme före fram till 8 timmar efter det att man har tagit tablett ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga.

1. Vande Walle J *et al.* Pharmacodynamic study using a new "MELT" formulation of desmopressin in children with PNE. ESPU, Sweden, June 14–18 2005.

**Vill du beställa nya block?
Se under sista bladet!**



DAGRÅD Tänk på att dina dagvanor påverkar din förmåga att var torr på natten.

- Kissa på regelbundna tider samt alltid innan du skall vara utomhus en längre stund eller har svårt att komma åt en toalett. Kissa då även om du inte känner dig kissnödig.
- Kissa alltid direkt då du stigit upp på morgonen och just innan du går till sängs på kvällen.
- Skjut aldrig upp toalettbesök när du är bajsnödig.
- Glöm inte att dricka regelbundet under dagen men drick sparsamt på kvällen.

Nattschema

Fyll i nedanstående schema över MINIRIN-behandlingens effekt och **ta med** till din läkare/sjuksköterska/uroterapeut vid återbesök!

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag
VECKA 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VECKA 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VECKA 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VECKA 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VECKA 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T = torrt **v** = vått (stort **V** – stor mängd, litet **v** – liten mängd)

Namn..... Personnr.....

Information om MINIRIN® (desmopressin) 120 µg Frystorkad tablett

Vi ber dig att läsa igenom informationsbladet, antingen du nu ska börja använda MINIRIN för första gången eller om du använt MINIRIN tablett tidigare. Observera att den inte ersätter bipacksedeln, som också bör läsas.

MINIRIN 120 µg frystorkad tablett är speciellt utvecklad för att smälta snabbt i munnen, även kallad smältablett.

En fördel med denna egenskap är att tablettens är lätt att ta utan vätska. Den är också speciellt bra för den som tycker att det är svårt eller obehagligt att svälja vanliga tabletter.


Vid behandling med MINIRIN ska vätskeintaget begränsas. 1 timme före fram till 8 timmar efter det att man har tagit smältabletten ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga.

Om du har använt MINIRIN tablett tidigare kan det vara bra att känna till att en smältablett MINIRIN 120 µg (mikrogram) motsvarar en tablett MINIRIN 0,2 mg (milligram).

MINIRIN smältablett är spröd och kan därför inte tryckas genom folien. Ta istället ut tablettens ur kartan genom att dra av aluminiumhöljet.

Öppningsinstruktioner

1. Börja med att ta bort ytterkanten som är markerad med en hand.
2. Riv därefter av en tablett längs med perforeringen.
3. Dra därefter av folien med start i det markerade hörnet. Tag sedan ut tablettens och lägg den under tungan.



2.



3.



Tänk på att alltid torka läkemedlet utom racknail för små barn. MINIRIN smältablett är fuktkänslig och ska alltid förvaras i originalförpackningen.

Övrigt.....



Ferring Läkemedel AB

Svarspost
201 189 500
203 10 Malmö

*Är dina block slut?
Fyll i och returnera så
kommer det nya!*

Ja tack! Jag vill gärna att ni skickar.....st patientblock till mig

Namn.....

Adress.....

.....

.....

Postnummer.....

Ort.....





Minirin® (desmopressin) – frystorkade tabletter 60 µg (motsvarar 0,1 mg tablett) och 120 µg (motsvarar 0,2 mg tablett). **Indikationer:** Primär nattlig enures (fr om 6 års ålder) när enureslarm inte givit önskad effekt hos patienter med normal förmåga att koncentrera urin. Symtomatisk behandling av nocturi hos vuxna, förenad med nattlig polyuri, dvs en nattlig urinproduktion som överstiger funktionell blåskapacitet. Central diabetes insipidus. Vid förskrivning på indikationerna nocturi och central diabetes insipidus var vänlig se vidare i FASS. **Dosering:** Dosen av Minirin anpassas individuellt. En lämplig initialdos är 120 µg sublinguallt till natten. Dosen kan ökas upp till 240 µg sublinguallt om den lägre dosen inte är tillräckligt effektiv. Vätskerestriktion ska iakttas.

Om tecken eller symptom på vattenretention och/eller hyponatremi uppkommer, bör behandlingen avbrytas till patienten återhämtat sig helt. Strikta vätskerestriktioner är nödvändiga när behandlingen sedan återupptas.

Kontraindikationer: Habituell eller psykogent betingad polydipsi (dygnsurinvolyv över 40 ml/kg), känd eller misstänkt hjärtinkompensation och andra tillstånd som kräver behandling med diuretika, måttlig till svår njurinsufficiens (kreatininclearance mindre än 50 ml/min), syndrom med störd ADH-sekretion (SIADH), känd hyponatremi, överkänslighet mot desmopressin eller mot något av hjälpämnen.

Varningar och försiktighet: Vid behandling av primär nattlig enures och nocturi, ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga under perioden 1 timme före till 8 timmar efter administrering. Utan samtidig minskning av vätskeintaget, kan behandlingen leda till vattenretention och/eller hyponatremi (huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramp). Behandling med desmopressin bör avbrytas vid akuta sjukdomar med rubbad vätske- och/eller elektrolytbalans som vid systeminfektioner, feber och gastroenterit. **Förpackningar:** Aluminium/aluminium blister à 10 frystorkade tabletter. **Förpackningsstorlekar:** 60 µg: 30 och 100 st. 120 µg: 30 och 100 st.

För komplett FASS-text, se www.fass.se

Ferring Läkemedel AB,
Box 4041, 203 11 Malmö
Tel: 040-691 69 00
Fax: 040-691 69 95
www.ferring.se

FERRING

PHARMACEUTICALS

MEDICINE ON THE BODY'S OWN TERMS

